

Abteilung

Orthoptera

Heuschrecken u. Grillen (49)

(A. Koschuh 2006, 2007; L. Zechner 1998)

Tettigoniidae

Laubheuschrecken (24)

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

Sichelschrecke (Zinsberg, Klausen, Muggendorf, Sulzbach, Königsberg, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, Wiesenbrachen u. Vorwaldstadien)

Phaneroptera nana Fieber, 1853

Vierpunktige Sichelschrecke (KG Sulzbach)

Isophya camptoxypha (Fieber, 1853)

Fiebers Plumpschrecke (Zinsberg, Königsberg, Güllitz in lichten Wäldern und extensiven Grünland)

Isophya krausii Brunner von Wattenwyl, 1878

Plumpschrecke (Klausen)

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1798)

Laubholz-Säbelschrecke (Zinsberg, Klausen, Königsberg, Güllitz) Waldlichtungen und Waldränder

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)

Langflügelige Schwertschrecke (Königsberg, Kirchberger Teiche, mesophile, nasse Grünbrachen)

Leptophyes albovittata (Kollar, 1833)

Gestreifte Zartschrecke (Klausen, Muggendorf, Güllitz, Riegersburg, an Waldrändern)

Leptophyes boscii (Fieber, 1853)

Boscis Zartschrecke (Zinsberg, Klausen, Königsberg, Klöchberg, Güllitz) Vorhölzer und Waldränder

Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825)

Wantschaftschrecke (Aigen, 02.07.2006, pannonischer Trockenrasen) derzeit einziges Vorkommen für die Steiermark

NT Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Große Schiefkopfschrecke (Zinsberg, Stainz bei Straden, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, Kirchberger Teiche) in Wiesen und an Waldsäumen, euryök

Meconema meridionale A. Costa, 1860

Südliche Eichenschrecke (Riegersburg) In Waldsäumen

Meconema thalassinum (Degeer, 1773)

Eichenschrecke (Zinsberg, Klausen, Königsberg, Güllitz) naturnahe Wälder

NT Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)

Warzenbeißer (Zinsberg, Aigen) Trockenrasen-Bewohner

Tettigonia cantans (Fuessly, 1775)

Zwitscherschrecke (Zinsberg)

<i>Tettigonia viridissima</i> Linnaeus, 1758	<u>Grünes Heupferd</u> (Zinsberg, Klausen, Stainz/Straden, Jörgen, Aigen, Königsberg, Klöchberg, Güllitz) euryök
<i>NT Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778) = <i>grisea</i>	<u>Graue Beißschrecke, Westliche Beißschrecke</u> (Zinsberg, Klausen, Königsberg, Klöchberg, Muggendorf, Sulzbach, Riegersburg) in Halbtrockenrasen
<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<u>Roesels Beißschrecke</u> (Zinsberg, Stainz bei Straden, Aigen, Güllitz, Riegersburg) in Wiesen, euryök
<i>Metrioptera bicolor</i> (Philippi, 1830)	<u>Zweifarbige Beißschrecke</u> (Aigen, pannonische Trockenrasen, Klöchberg, in trockenen Brachen)
<i>Odontopodisma schmidtii</i> (Fieber, 1853)	<u>Gestreifte Grünschrecke, Östliche Grünschrecke</u> (Güllitz, bei Fehring, um Gleichenberg, Kirchberger Teiche in feuchten Hochstaudenfluren, an Waldrändern)
<i>Pholidoptera aptera</i> (Fabricius, 1793)	<u>Alpen- Strauschschrecke</u> (Zinsberg, Klausen, Gleichenberg, Hochstraden, Nägelsdorf, Stainz/Straden, Königsberg, Riegersburg) Waldart mit alpiner Verbreitung
<i>Pholidoptera griseoaptera</i> (De Geer, 1773)	<u>Gewöhnliche Strauschschrecke</u> (Zinsberg, Klausen, Stainz/Straden, Aigen, Königsberg, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, Kirchberger Teiche) häufigste Waldart
<i>Pholidoptera fallax</i> (Fischer, 1853)	<u>Südliche Strauschschrecke</u> (Aigen, pannonische Trockenrasen 02.07.2006)
<i>Ephippiger ephippiger</i> (Fiebig, 1784)	<u>Steppen - Sattelschrecke</u> (Klausen)
<i>Pachytrachis gracilis</i> (Brunner von Wattenwyl, 1861)	<u>Zierliche Südschrecke</u> (Königsberg, Klöchberg, Erstnachweise für die OstSteiermark)

Gryllidae

Grillen (5)

<i>Myrmecophila acervorum</i> (Panzer)	<u>Ameisengrille</u> (Klausen) Die kleine Grille kommt nur in Gesellschaft von Ameisen in besonders warmen Gebieten vor. Eine Seltenheit für die Steiermark.
<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<u>Feldgrille</u> (Zinsberg, Stainz bei Straden, Klöchberg, Riegersburg, in sonnigen extensiven Wiesen)
<i>Modicogryllus frontalis</i> (Fieber, 1844)	<u>Östliche Grille</u> (KG Muggendorf, Riegersburg)
<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	<u>Sumpfgrille</u> (Stainz bei Straden, Güllitz, in wechselfeuchten bis nassen Wiesen)
<i>Oeceanthus pellucens</i> (Scopoli, 1773)	<u>Weinhähnchen</u> (Klausen, Königsberg, Klöchberg, Riegersburg) Eine südöstliche Baumgrille die auf besonders trockene Lebensräume spezialisiert ist.

In der Steiermark nur im steirischem
Tertiärbecken.

Catantopidae Knarrschrecken, Gebirgsschrecken (2)

VU Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)

Italienische Schönschrecke (Zinsberg, Klausen, Rosenberg, Klöchberg, Zaraberg, Riegersburg) thermophiles Faunenelement an bodenoffenen Halbtrockenrasen

Pezotettix giornae (Rossi, 1794)

Kleine Knarrschrecke (Aigen, Königsberg, Klöchberg, Kalch, Radochen) Erstfund für Mitteleuropa 1992 in Aigen, Erster Waldfund am Königsberg

Acrididae Feldheuschrecken (17)

Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)

Rotflügelige Schnarrschrecke (Klausen)

NT Oedipoda caerulea (Linnaeus, 1758)

Blaufügelige Ödlandschrecke (Zinsberg, Klausen, Muggendorf, Sulzbach, Gossendorfer Trasssteinbruch, Klöchberg, Riegersburg) euryök, an offenen und sonnigen Stellen

Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)

Sumpfschrecke (Karbach, Wieden, Güllitz, nasse Wiesen)

NT Chrysochraon dispar (Germar, 1834)

Große Goldschrecke (Zinsberg, Stainz bei Straden, Güllitz, Riegersburg, in Grünlandbrachen und Magerwiesen)

Euthystira brachyptera (Ocskay, 1826)

Kleine Goldschrecke (Zinsberg, KG Muggendorf, KG Sulzbach, Güllitz)

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)

Großer Heidegrashüpfer (Zinsberg, KG Muggendorf, Klöchberg) in nährstoffarmen, sonnigen Wiesen, euryök

Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)

Rote Keulenschrecke, Gemeine Keulenschrecke (Zinsberg, Klausen, Stainz/Straden, Königsberg, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg) an strukturierten Waldrändern

Chortippus brunneus (Thunberg, 1815)

Brauner Grashüpfer (Klausen, Stainz/Straden, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, euryök, an offenen sonnigen Stellen)

NT Chorthippus mollis (Charpentier, 1825)

Verkannter Grashüpfer, Rotbeiniger Grashüpfer (Stainz/Straden, Riegersburg, Zinsberg)

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)

Wiesengrashüpfer (Stainz bei Straden, Güllitz, Riegersburg, Kirchberger Teiche, Goritz, Zinsberg) euryöke Wiesenart

<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<u>Gemeiner Grashüpfer</u> (Stainz bei Straden, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, Zinsberg) euryök
<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Nachtigall-Grashüpfer</u> (Klausen, Stainz/Straden, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, Kirchberger Teiche, Zinsberg) euryöke Wiesenart
<i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	<u>Steppen-Grashüpfer</u> (Klausen, Zarawald, Königsberg, colline Waldheiden)
<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisot de Barneville, 1849)	<u>Dickkopf-Grashüpfer</u> (Klöchberg, Zinsberg) erst seit 1994 aus der OstSteiermark (Fürstenfeld, Zechner et al 1997) für Österreich bekannt, reicht die Verbreitung derzeit bis an die Thermenlinie)
<i>NT Mecostethus parapleurus</i> (Hagenbach, 1822)	<u>Lauschschrecke</u> (Zinsberg, Stainz/Straden, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, Kirchberger Teiche im mesophilen Grünland, euryök)
<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	<u>Buntbäuchiger Grashüpfer</u> (Klöchberg, an sehr nährstoffarmen, sonnigen Stellen)

Tetrigidea

Dornschröcken (2)

<i>NT Tetrix tenuicornis</i> (Sahlberg, 1893)	<u>Langfühler-Dornschröcke</u> (Zinsberg, KG Muggendorf, Königsberg, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg) offener wechselfeuchter Lehmboden
<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Säbeldornschröcke</u> (KG Sulzbach, Königsberg, Güllitz, feuchte Wälder und Wiesen)