

Abteilung

Hemiptera

Wanzen (214)

Gerridae

Wasserläufer (1)

Aquarius paludum (Fabricius, 1794)

Sumpf-Wassermann (Güllitz, 1. Wiederfund seit Sabransky 1912)

Hydrometridae

Teichläufer (1)

Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)

Gemeiner Teichläufer (Riegersburg)

Saldidae

Ufer- oder Springwanzen (1)

Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)

Gemeine Springwanze (Höll, Riegersburg)

Miridae

Weich- oder Blindwanzen (89)

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)

(Zinsberg, Höll, Güllitz, Riegersburg) an Fabaceae

Adelphocoris reicheli Fieber

(Radkersburg)

Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775)

(Zinsberg, Höll, Güllitz, Riegersburg) an Fabaceae

Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)

(Klöchberg, Riegersburg, zoophytophag, nur im Südosten Österreichs)

Agnocoris rubicundus

(Höll)

Alloeotomus germanicus Wagner, 1939

(Riegersburg)

Alloeotomus gothicus (Fallén, 1807)

(Riegersburg)

Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1835)

(Güllitz, an Brennessel)

Blepharidopterus angulatus

(Höll)

Bothynotus pilosus

(Höll) Zweiter Nachweis für die Steiermark. Bindung an Feuchtlebensräume wahrscheinlich.

Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835)

Gewöhnliche Schmuckwanze (Zinsberg, Königsberg, Klöchberg, Riegersburg) an Brennessel

<i>Capsodes gothicus</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Güllitz, Riegersburg) an div. Kräutern
<i>Charagochilus cf. gyllenhalii</i> (Fallén, 1807)	(Zinsberg, Höll, Riegersburg, Radkersburg)
<i>Charagochilus weberi</i> Wagner, 1953	(Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, an Galium eruptivum und anderen Galium-Arten, Die ersten 3 Funde für die Steiermark)
<i>Chlamydatus pulicarius</i> (Fallén, 1807)	(Höll, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg euryök und polyphag)
<i>Compsidolon salicellum</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)	<u>Haselnuss-Weichwanze</u> (Riegersburg)
<i>Criocoris crassicornis</i>	(Höll)
<i>Cyllecoris histrionius</i> (Linnaeus, 1767)	(Höll)
<i>Deraeocoris ruber</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Rote Halsringweichwanze</u> (Zinsberg, Höll, Königsberg, Güllitz, Riegersburg) euryök an Kräutern
<i>Deraeocoris lutescens</i> (Schilling, 1837)	<u>Helle Halsringweichwanze</u> (Zinsberg, Höll, Königsberg, Güllitz, Riegersburg) carnivor an Laubhölzern
<i>Dicyphus globulifer</i> (Fallén, 1807)	<u>Kugelförmige Zweibuckelweichwanze</u> (Riegersburg)
<i>Dicyphus errans</i> (Wolff, 1804)	<u>Unstete Zweibuckelweichwanze</u> (Riegersburg)
<i>Dicyphus hyalinipennis</i> (Burmeister, 1835)	<u>Tollkirschen-Zweibuckenweichwanze</u> (Riegersburg)
<i>Dryophilocoris flavoquadrimaculata</i> (De Geer, 1773)	(Höll)
<i>Globiceps fulvicollis</i> Jakovlev, 1877	<u>Abgeflachter Kugelkopf</u> (Zinsberg)
<i>Halodapus montandoni</i> (Reuter, 1875)	(Zinsberg) Neufund für die Steiermark!
<i>Halticus apterus</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Flügellose Springweichwanze</u> (Zinsberg, Güllitz, Riegersburg) an Fabaceae
<i>Halticus luteicollis</i> (Panzer, 1804)	<u>Gelbkopf-Springweichwanze</u> (Königsberg, Klöchberg, Riegersburg, im Pannonikum an div. Kräutern u. Clematis vitalba, 2. Funde für die Steiermark)
<i>Harpocera thoracica</i> (Fallén, 1807)	(Höll)
<i>Heterocordylus genistae</i>	(Höll)
<i>Heterotoma planicornis</i> (Pallas, 1772)	(Riegersburg) Neufund für die Steiermark
<i>Isometopus intrusus</i>	(Höll) Erstfund für die Steiermark. Lebt räuberisch auf mit Flechten und Moosen bewachsenen Obstbäumen
<i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Höll, Güllitz) an div. Gräsern
<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabrisius, 1781)	<u>Brennessel-Weichwanze</u> (Riegersburg, Radkersburg)

<i>Lygocoris pabulinus</i> (Linnaeus, 1761)	(Höll)
<i>Lygus gemellatus gemellatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	(Höll) Zweiter Nachweis für die Steiermark. (Riegersburg) Ostmittelmeerart auf Beifuß- Gewächsen
<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeine Wiesenwanze (Zinsberg, Klöchberg, Riegersburg) an Asteraceae
<i>Lygus rugulipennis</i> Poppius, 1911	(Höll, Riegersburg)
<i>Macrotylus molliculus</i> (Fallèn, 1807)	(Zinsberg)
Macrotylus paykullii	(Höll) Erstfund für die Steiermark. Lebt auf dem Dornigen Hauhechel.
<i>Macrotylus quadrilineatus</i> (Schrank, 1785)	Viergestreifte Dicknase, Salbei- Weichnase (Zinsberg, Riegersburg) an Salvia - Salbei
Macrotylus solitarius	(Höll)
<i>Mecomma ambulans</i> (Fallèn, 1807)	(Zinsberg)
<i>Megaloceroea recticornis</i> (Geoffroy, 1785)	(Zinsberg, Höll, Königsberg, Klöchberg, Güllitz) an div. Gräsern
Megacoelum beckeri	(Höll) Zweiter Nachweis für die Steiermark.
<i>Miris striatus</i> (Linnaeus, 1758)	(Höll) Pflanzensaugend auf Kiefern.
<i>Notostira erratica</i> (Linnaeus, 1758)	(Höll, Radkersburg)
Notostira elongata	(Höll, Riegersburg)
Oncotylus punctipes Reuter, 1875	Rainfarn-Krummnase (Güllitz, an Tanacetum vulgare, Neufund für die Steiermark)
<i>Orthonotus rufifrons</i> (Fallèn, 1807)	(Königsberg, Riegersburg, an Brennessel)
Orthops basalis (A. Costa, 1853)	(Zinsberg, Riegersburg)
Orthops campestris	(Höll, Riegersburg)
<i>Orthops kalmii</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Höll, Riegersburg)
<i>Orthotylus</i> sp.	(Riegersburg)
Orthotylus marginalis	(Höll)
<i>Orthotylus nassatus</i> (Fabricius, 1787)	(Höll)
<i>Phylus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1767)	(Höll)
<i>Phytocoris longipennis</i> Flor, 1861	Langbeinige Laubweichwanze (Höll, Königsberg, an diversen Laubgehölzen)
Phytocoris tiliae tiliae	(Höll)
<i>Phytocoris ulmi</i> (Linnaeus, 1758)	Ulmen-Laubweichwanze (Zinsberg, Königsberg, Riegersburg) an div. Laubhölzern und Kräutern

<i>Pilophorus clavatus</i> L.	(Radkersburg)
<i>Pilophorus perplexus</i> Douglas & Scott, 1875	(Zinsberg, Riegersburg)
<i>Pinalitus cervinus</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)	(Riegersburg)
<i>Pinalitus rubricatus</i> (Fallén, 1807)	(Riegersburg)
<i>Placochilus seladonicus</i> (Fallén, 1807)	(Zinsberg, Riegersburg) an Knautia – Witwenblume und Scabiosa - Skabiose
<i>Plagiognathus arbustorum arbustorum</i> (Fabricius, 1794)	(Höll, Riegersburg)
<i>Plagiognathus chrysanthemi</i> (Wolff, 1804)	(Zinsberg, Riegersburg)
<i>Plagiognathus fulvipennis</i> (Kirschbaum, 1856)	(Güllitz, an <i>Echium vulgare</i> , 1. Wiederfund seit Moosbrugger 1946)
<i>Polymerus asperulae</i> (Fieber, 1861)	(Riegersburg) 3. Nachweis für die Steiermark
<i>Polymerus holosericeus</i> Hahn, 1831	(Höll)
<i>Polymerus microphthalmus</i> (Wagner, 1951)	(Höll)
<i>Polymerus unifasciatus</i> (Fabricius, 1794)	(Höll, Güllitz, an <i>Galium</i>)
<i>Polymerus vulneratus</i> (Panzer, 1806)	(Zinsberg, Höll) Erstfund für die Steiermark. Auf trockenen Standorten mit Labkräutern.
<i>Psallus ambiguus</i>	(Höll)
<i>Psallus confusus</i> Rieger, 1981	(Riegersburg) Neufund für die Steiermark
<i>Psallus quercus</i>	(Höll)
<i>Psallus cf. perrisi</i> (Mulsant & Ray, 1852)	(Höll)
<i>Psallus variabilis</i> (Fallén, 1807)	(Höll)
<i>Psallus cf. albicinctus</i> (Kirschbaum, 1856)	(Höll) Erstfund für die Steiermark. Lebt auf Eiche.
<i>Psallus haematodes</i>	(Höll)
<i>Psallus varians varians</i> (Herrich-Schaeffer, 1841)	(Höll)
<i>Reuteria marqueti</i> Puton, 1875	(Königsberg, thermophile pannonische Laubwälder, Erstfund für die Steiermark)
<i>Rhabdomiris striatellus striatellus</i> (Fabricius, 1794)	(Höll)
<i>Stenodema calcarata</i> (Fallén, 1807)	<u>Bedornte Grasweichwanze</u> (Höll, Güllitz, an div. Gräsern feucht-nasser Standorte)
<i>Stenodema laevigata</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Glatte Grasweichwanze</u> (Zinsberg, Höll, Königsberg, Riegersburg) an div. Gräsern
<i>Stenodema virens</i> (Linnaeus, 1767)	(Höll)
<i>Stenotus binotatus</i> (Fabricius, 1794)	(Zinsberg, Höll, Königsberg, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg) an Gräsern feuchtschattiger Standorte

<i>Trigonotylus caelestialium</i> (Kirkaldy, 1902)	(Höll, Güllitz, Riegersburg, an div. Gräsern)
<i>Trigonotylus ruficornis</i>	(Höll, Radkersburg)

Tingidae Netz- oder Gitterwanzen (8)

<i>Agramma laeta</i> Fallen	(Radkersburg)
<i>Tingis pilosa</i> Hummel, 1825	<u>Behaarte Netzwanze</u> (Höll, Riegersburg)
<i>Tingis reticulata</i> Herrich-Schaeffer, 1835	<u>Schwarzadrigte Netzwanze</u> (Klöchberg) an Verbascum – Königskerze und Ajuga - Günsel
<i>Onochila scapularis</i> (Fieber, 1844)	<u>Gekielte Wolfsmilch-Netzwanze</u> (Zinsberg) an Euphorbia - Wolfsmilch
<i>Oncochila simplex</i> (Herrich-Schaeffer, 1830)	<u>Einfache Wolfsmilch-Netzwanze</u> (Güllitz, an Euphorbia)
<i>Dictyonota strichnocera</i> Fieber, 1844	<u>Behaarte Netzwanze</u> (Zinsberg) an Sarothamnus – Besenginster
<i>Dictyla lupuli</i> H.S.	(Radkersburg)
<i>Dictyla humili</i>	(Höll)

Reduviidae Raubwanzen (5)

<i>Coranus kerzhneri</i> P.V. Puttshkov, 1982	<u>Kerzhner`s Raubwanze</u> (Zinsberg)
<i>Pirates hybridus</i> (Scopoli, 1763)	(Klausen)
<i>Rhynocoris annulatus</i> (Linnaeus)	<u>Geringelte Mordwanze</u> (Klausen)
<i>Rhynocoris iracundus</i> (Poda, 1761)	<u>Rote Mordwanze, Zornige Raubwanze</u> (Zinsberg, Klausen, Höll, Riegersburg)
<i>Rhynocoris-Larven</i>	(Zinsberg, Klöchberg)
<i>Pygolampis bidentata</i> (Gz.)	(Klausen)

Nabidae Sichelwanzen (7)

<i>Himacerus apterus</i> (Fabricius, 1798)	<u>Ungeflügelte Sichelwanze</u> (Königsberg, euryök)
<i>Himacerus mirmicoides</i> (O. Costa, 1834)	<u>Ameisenähnliche Sichelwanze</u> (Zinsberg, Höll, Königsberg, Klöchberg, Riegersburg) euryök, carnivor
<i>Nabis brevis</i> (Scholtz, 1847)	(Zinsberg, Königsberg, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg) leicht thermophil, carnivor

<i>Nabis ferus</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Riegersburg)
<i>Nabis pseudoferus</i> Remane, 1949	(Höll, Königsberg, euryök, carnivor)
<i>Nabis punctatus punctatus</i> A. Costa, 1847	(Höll) Zweiter Fund für die Steiermark, (Riegersburg)
<i>Nabis rugosus</i> (Linnaeus, 1758)	(Königsberg, euryök, carnivor)

Anthocoridae

Blumenwanzen (12)

<i>Lycocoris campestris</i> (Fieber, 1794)	<u>Geflügelte Bettwanze</u> (Zinsberg)
<i>Temnostethus pusillus</i> (Herrich – Schaeffer, 1835)	(Höll)
<i>Temnostethus gracilis</i>	(Höll)
<i>Anthocuris limbatus</i>	(Höll)
<i>Anthocoris nemoralis</i>	(Höll)
<i>Anthocoris confusus</i> Reuter, 1884	(Höll, Riegersburg)
<i>Orius majusculus</i> (Reutter, 1879)	(Höll)
<i>Orius minutus</i> (Linnaeus, 1758)	(Höll, Klöchberg, Güllitz, Riegersburg, euryök und carnivor)
<i>Orius cf. Vicinus</i> (Ribaut, 1923)	(Riegersburg) Neufund für die Steiermark
<i>Orius niger</i> (Wolff, 1811)	(Höll, Klöchberg, Riegersburg, euryök und carnivor)
<i>Xylocoris cursitans</i> (Fallen, 1807)	(Zinsberg, Riegersburg) xylobiont – holzlebend an Laubhölzern
<i>Xylocoris galactinus</i>	(Höll)

Aradidae

Rindenwanzen (6)

<i>Aradus bimaculatus</i>	(Höll)Erstfund für die Steiermark.
<i>Aradus cinnamomeus</i> (Panzer)	<u>Kiefern-rindenwanze</u> (Klausen) Sie lebt ausschließlich auf Kiefern und saugt deren Säfte vorzugs halber auf dünnen Ästen. Der erste Nachweis für die Steiermark.
<i>Aradus conspicuus</i> Herrich – Schaeffer, 1835	<u>Große Rindenwanze</u> (Klausen)
<i>Aradus cf. Krueperi</i> Reuter, 1884	<u>Krueper´s Rindenwanze</u> (Riegersburg) Neufund für die Steiermark. Nur im Pannonikum.
<i>Aradus kuthyi</i> Horv.	(Klausen) Lebt an Eichen. Der erste Nachweis für Österreich. Sonst nur aus Ungarn, Slowakei und Albanien bekannt.

Aneurus avenius (Duf.)

Plattwanze (Klausen)

Berytidae

Stelzenwanzen

(4)

Berytinus minor

(Höll)

Berytinus clavipes (Fabricius, 1775)

Keulenfüßige Stelzenwanze (Riegersburg)

Metatropis rufescens (Herrich-Schaeffer, 1935)

Hexenkrautwanze (Klausen)

Gampsocoris culicinus Seidenstücker, 1948

Stechmückenartige Stelzenwanze (Königsberg, Klöchberg, an Stachys und Digitalis)

Piesmatidae

Meldenwanzen

(1)

Piesma maculatum (Laporte, 1833)

Gefleckte Meldewanze (Zinsberg, Höll, Riegersburg)

Pyrrhocoridae

Feuerwanzen

(1)

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

Feuerwanze, Brillenwanze (Riegersburg)

Coreidae

Randwanzen, Lederwanzen

(5)

Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

Schlehen- Randwanze (Klausen, Riegersburg)

Ceraleptus lividus Stein, 1858

(Riegersburg) Neufund für die Steiermark. Nur im Pannonikum.

Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schaeffer, 1835)

(Klausen, Klöchberg, pontomediterane Art, thermophil an Fabaceae) Die südosteuropäische Art konnte das zweite Mal in der Klausen für Österreich nachgewiesen werden.

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)

Lederwanze, Gewöhnliche Randwanze, Ampferwanze (Zinsberg, Höll, Güllitz, Riegersburg) an Rumex - Ampfer

Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763)

(Zinsberg, Klausen, Riegersburg)

Alydidae

Krummfühlerwanzen

(1)

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758)

Rotrückiger Irrwisch (Zinsberg, Klausen, Höll, Klöchberg) an Ginster-Arten

Rhopalidae Glasflügelwanzen (11)

<i>Myrmus miriformis</i> (Fallén, 1807)	<u>Ameisen- Glasflügelwanze</u> (Riegersburg)
<i>Corizus hyoscyami</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg, Klausen, Höll, Riegersburg)
<i>Rhopalus conspersus</i> (Fieber, 1837)	(Zinsberg, Klöchberg) thermophil an Thymus - Thymian und Medicago – Hopfenklee, Luzerne
<i>Rhopalus maculatus</i> (Fieber, 1837)	(Güllitz, nass-feuchte Standorte)
<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling, 1829	(Güllitz, Riegersburg, an div. Kräutern)
<i>Rhopalus rufus</i> Schilling, 1829	(Zinsberg, Riegersburg)
<i>Rhopalus subrufus</i> (Gmelin, 1790)	(Zinsberg, Königsberg, Riegersburg) an div. Kräutern
<i>Stictopleurus abutilon</i> (Rossi, 1790)	(Zinsberg, Klöchberg, Riegersburg) in Trockenwiesen an Korbblütlern
<i>Stictopleurus crassicornis</i> (Linnaeus, 1758)	(Zinsberg)
<i>Stictopleurus pictus</i> (Fieber, 1861)	(Höll) Zweiter Fund für die Steiermark – Gleiche Fundstelle. Kommt im gesamten Mittelmeerraum vor.
<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> (Goeze, 1778)	(Zinsberg)

Lygaeidae Ritterwanzen, Boden- oder Langwanzen (27)

<i>Aellopus atratus</i> (Goeze, 1778)	(Riegersburg)
<i>Cymus aurescens</i> Distant, 1883	(Zinsberg, Güllitz) an feucht-nassen Standorten, an Scirpus – Simse und Carex - Segge
<i>Dimorphopterus spinolae</i> (Signoret, 1857)	<u>Spinola`s Schmalwanze</u> (Zinsberg) an Agrostis - Straußgras
<i>Drymus</i> sp.	(Riegersburg)
<i>Emblethis verbasci</i> (Fabricius, 1803)	<u>Königskerzen-Bodenwanze</u> (Klöchberg, thermophil und heliophil)
<i>Geocoris erythrocephalus</i> (Lepelletier & Serville, 1825)	<u>Rotköpfige Grillenwanze</u> (Zinsberg, Klausen, Klöchberg, Riegersburg) an Galium – Labkraut, in trockenen lückigen Standorten. Eine auffallende in Trockenwiesen lebende Art, die das erste Mal in der Klausen für Österreich nachgewiesen werden konnte. Eine ums Mittelmeer verbreitete Art. Sie erreicht über Ungarn noch die Slowakei und Mähren.

<i>Heterogaster cathariae</i> (Geoffroy, 1785)	<u>Katzenminze-Bodenwanze</u> (Riegersburg) Neufund für die Steiermark.
<i>Ischnocoris hemipterus</i> (Schilling, 1829)	(Klöchberg, thermophil an trockenen lückigen Standorten)
<i>Kleidocerys resedae</i> (Panzer, 1797)	(Höll, Riegersburg)
<i>Lygaeus equestris</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Ritterwanze</u> (Königsberg, Klöchberg, Riegersburg, thermophil an Vincetoxicum)
<i>Lygaeus simulans</i> (Deckert, 1985)	<u>Verkannte Ritterwanze</u> (Königsberg, thermophil, Neufund für die Steiermark)
<i>Megalonotus chriagra</i>	(Höll)
<i>Megalonotus praetextatus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	(Klöchberg, an Gräsern trockener Orte, thermophil und heliophil, Neufund für die Steiermark)
<i>Metopoplax origani</i> (Kolenati, 1845)	<u>Östliche Kamillenwanze</u> (Zinsberg)
<i>Nysius thymi</i> (Wolff, 1804)	(Zinsberg, Riegersburg)
<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<u>Malvenwanze</u> (Zinsberg, Radkersburg) auf Fraxinus – Esche, Tilia – Linde, Malva – Malve, Althaea – Eibisch; Ein Neueinwanderer, der sich expansiv verbreitet
<i>Oxycarenus pallens</i> (Herrich-Schaeffer, 1850)	(Zinsberg) an Centaurea – Flockenblume, Neufund für die Steiermark
<i>Platylax salviae</i> (Schilling, 1829)	(Höll)
<i>Pterotmetus staphyliniformis</i> (Schilling, 1829)	<u>Kurzflügelwanze, Kurzflüglerartige Bodenwanze</u> (Zinsberg, Klausen, Riegersburg)
<i>Raglius alboacuminatus</i> (Goeze, 1778)	(Klöchberg, Riegersburg, trockene Standorte)
<i>Raglius confusus</i> (Reuter, 1886)	(Riegersburg) nur im Pannonikum und im südöstlichen Vorland
<i>Rhyparochromus alboacuminatus</i>	(Höll)
<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (Schilling, 1829)	(Höll)
<i>Scolopostethus grandis</i> Horváth, 1880	(Riegersburg)
<i>Taphropeltus contractus</i> (Herrich-Schaeffer, 1835)	(Königsberg, thermophil, trockenlückige Standorte)
<i>Trapezonotus dispar</i> Stål, 1872	(Riegersburg)
<i>Tropistethus holosericeus</i> (Scholtz, 1846)	(Klöchberg, thermophil an trockenen lückigen Standorten)

Plataspidae

Kugelwanzen (1)

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785)

(Zinsberg, Höll, Riegersburg)

Cydnidae Erdwanzen (4)

Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785)

Weißrandige Erdwanze (Riegersburg)

Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839)

Sechsfleckige Erdwanze (Riegersburg)

Canthophorus dubius (Scopoli, 1763)

Zweifelhafte Erdwanze (Zinsberg) an Thesium -
Berglein

Canthophorus impressus Horváth, 1881

(Höll)

Scutelleridae Schildwanzen (2)

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

Gras-Schildwanze (Zinsberg, Klöchberg,
Riegersburg) an Gräsern trockener Standorte

Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785)

Schildkrötenwanze (Güllitz, Riegersburg) an
Gräsern feuchter Orte

Pentatomidae Baumwanzen (25)

Podops inunctus (Fabricius, 1775)

Hakenwanze, Amboss-Schildwanze (Güllitz, in
feuchten Wiesen)

Vilpianus galii (Wolff, 1802)

Gelblabkraut-Baumwanze (Klöchberg,
xerothermophil, an Galium verum, Neufund für die
Steiermark)

Sciocoris homalonotus Fieber, 1851

Große Brachwanze (Riegersburg) 2. Nachweis
für die Steiermark

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

Spitzling, Getreidespitzwanze, Getreidewanze
(Zinsberg, Klausen, Königsberg, Klöchberg,
Güllitz, Riegersburg) an Gräsern trockener
Standorte

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790)

(Riegersburg)

Neottiglossa leporina (H.-S.)

Dickkopfwanze (Klausen)

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)

Steifenwanze, Ruderleibchenwanze (Zinsberg,
Höll, Königsberg, Riegersburg, Dirnbach) an
Apiaceae

Palomena prasina (Linnaeus, 1761)

Grüne Stinkwanze, Faule Grete (Zinsberg, Höll,
Königsberg, Riegersburg) euryök an Laubgehölzen
und Urtica - Brennnessel

<i>Eurydema oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Kohlwanze</u> (Königsberg, Güllitz, euryök an Brassicaceae)
<i>Eurydema</i> sp.	(Riegersburg)
<i>Arma custos</i> (Fabricius, 1794)	<u>Waldwächter</u> (Güllitz, an Alnus, Betula und Tilia)
<i>Carpocoris fuscispinus</i> (Boheman, 1849)	<u>Braunspitzige Baumwanze</u> (Riegersburg)
<i>Carpocoris pudicus</i> (Poda, 1761)	<u>Südliche Baumwanze</u> (Klöchberg, Riegersburg, thermophil)
<i>Carpocoris purpureipennis</i>	(Höll)
<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Beerenwanze</u> (Höll, Klöchberg, Riegersburg, euryök und häufig)
<i>Pentatoma rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Rotbeinige Baumwanze</u> (Zinsberg, Höll, Königsberg, Riegersburg) euryök, an div. Laubgehölzen
<i>Eysarcoris aeneus</i> (Scopoli, 1763)	(Güllitz, Riegersburg, an Stachys sylvatica)
<i>Eysarcoris fabricii</i> Kirkaldy, 1904	(Klausen)
<i>Holcostethus sphacelatus</i> (Fabricius, 1794)	(Klausen, Klöchberg, Riegersburg, an trockenen Orten)
<i>Holcostethus vernalis</i> (Wolff, 1804)	(Riegersburg)
<i>Rubiconia intermedia</i> (Wolff, 1811)	(Zinsberg, Riegersburg)
<i>Staria lunata</i> (Hahn, 1835)	(Klöchberg, mediterrane Art, an Galium-Arten)
<i>Piezodorus lituratus</i> (Fabricius, 1794)	<u>Ginsterwanze, Ginster-Baumwanze</u> (Zinsberg, Klausen, Höll, Königsberg, Riegersburg) an Ginster-Arten
<i>Picromerus bidens</i> (Linnaeus, 1758)	<u>Zweispitzwanze</u> (Riegersburg)
<i>Raphigaster nebulosa</i> Poda	<u>Graue Feldwanze</u> (Radkersburg)

Acanthosomatidae Stachel- oder Bauchkielwanzen (3)

<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (Linnaeus, 1758)	(Höll)
<i>Elasmostethus minor</i>	(Höll)
<i>Elasmucha grisea</i> Linnaeus, 1758	<u>Fleckige Brutwanze</u> (Radkersburg)